










## Espèces limicoles des zones importantes pour la conservation des oiseaux

<b>Pluvier argenté</b>	<b>Pluvier bronzé</b>	<b>Pluvier kildir</b>	<b>Pluvier siffleur</b>	<b>Pluvier semipalmé</b>	<b>Avocette d'Amérique</b>	<b>Barge marbrée</b>	<b>Barge hudsonnienne</b>
 <p>ID: 11.5" (29cm). Ventre, face et bec noirs; dos moucheté de noir et de blanc; bec court; aisselles noires visibles en vol.</p>	 <p>ID: 10.5"(27cm). Ventre, face et bec noirs; dos et calotte mouchetés de brun; bec court.</p>	 <p>ID: 10.5" (27cm). Dos brun; ventre blanc; double collier noir; pattes sombres; bec noir et court. Le cri est un <i>kildir</i> strident et aigu.</p>	 <p>ID: 7.5" (19cm). Petit pluvier trapu; Dessus très pâle comparé à celui des autres pluviers; pattes orange; mince collier incomplet. Le cri est un sifflement plaintif grave <i>píp-lo</i> et une série de sifflements doux et bas.</p>	 <p>ID: 7" (18cm). Dos brun; ventre, joues et tache frontale blanches; pattes jaunes; bec jaune au bout noir (nuptial); collier et front noirs; bec court.</p>	 <p>ID: 18" (46cm). Tête cannelle; long bec noir et retroussé; corps blanc; ailes rayées noires.</p>	 <p>ID: 18" (46cm). Long bec orange légèrement retroussé au bout noir; longues pattes noires; plumage chamois-brun tacheté.</p>	 <p>ID: 15" (38cm). Long bec retroussé au bout noir; dessous des ailes noir et blanc; plumage gris moucheté de noir; poitrine rougeâtre en plumage nuptial.</p>
<b>Courlis corlieu</b>	<b>Chevalier semipalmé</b>	<b>Grand chevalier</b>	<b>Petit chevalier</b>	<b>Maubèche des champs</b>	<b>Bécassin roux / à long bec</b>	<b>Chevalier solitaire</b>	<b>Chevalier grivelé</b>
 <p>ID: 17.5" (44cm). La seule espèce manitobaine avec un long bec arqué; pattes grises relativement courtes; plumage uniformément gris-brun; calotte rayée sombre.</p>	 <p>ID: 15" (38cm). Moucheté gris-brun; longues pattes grises; bec gris épais de longueur moyenne; le motif noir et blanc distinctif des ailes est frappant en vol. Le cri est un <i>pill-ouill-ouillet</i> répété régulièrement.</p>	 <p>ID: 12" (30cm). Dessous blanc; dos noir carrelé de blanc; longues pattes jaunes; bec jaune moyennement long à peine retroussé avec la base pâle. Le cri est un <i>kiou-kiou-kiou</i> fort répété de 3 à 4 fois.</p>	 <p>ID: 9" (23cm). Plus petit que le grand chevalier; bec plus droit et plus pointu. Le cri est un ou deux sifflements, <i>piou-piou</i>.</p>	 <p>ID: 12" (30cm). Cou mince; petite tête avec petit bec jaune; pattes jaunes; longue queue. Elle préfère les habitats des prairies. Le cri est un sifflement bouillonnant qui monte lentement puis descend.</p>	 <p>ID: 11" (28cm). Long bec; pattes pales; roussâtre avec diverses mouchetures sombres. Ces deux espèces sont très semblables. Le cri du bécassin à long bec est un <i>Kîk grêle</i> (parfois répété). Celui du bécassin roux est un <i>tiou-tiou-tiou</i> rapide et liquide.</p>	 <p>ID: 8.5" (22cm). Ventre blanc; dos noir tacheté de blanc; cercle oculaire clair; bec droit; pattes jaune-verdâtre.</p>	 <p>ID: 7.5" (19cm). Poitrine blanche tacheté de brun en plumage nuptial; calotte et dos bruns; pattes et bec jaunes; bec de taille moyenne.</p>

# Espèces limicoles des zones importantes pour la conservation des oiseaux

<b>Bécasse d'Amérique</b>	<b>Bécasseau maubèche</b>	<b>Tournepierre à collier</b>	<b>Bécasseau à échasses</b>	<b>Bécasseau à poitrine cendrée</b>	<b>Bécasseau roussâtre</b>	<b>Bécasseau sanderling</b>	<b>Bécasseau variable</b>
							
<b>ID:</b> 11" (28cm). Trouvée principalement en milieu boisé; corps rondelet; long bec; grosse tête; dessous chamois; gorge grise; joues chamois; calotte noire. En vol, sifflement produit par les ailes.	<b>ID:</b> 9.5" (24cm). Pattes et bec noirs et courts; tête et poitrine rouges en plumage nuptial (gris le reste de l'année); dos brun-gris moucheté; croupion blanc.	<b>ID:</b> 7.5" (19cm). Trapu; bec court sombre; courtes pattes orange; face bariolée comme un clown; flancs roux vif en plumage nuptial.	<b>ID:</b> 8.5" (22cm). Longues pattes verdâtres; cou long; bec moyennement long au bout arqué; plumage nuptial fortement barré; tache rouille à la joue.	<b>ID:</b> 8.5" (22cm). Bec moyennement long au bout légèrement arqué; bec jaune à bout noir; pattes jaunes; raies brunes serrées à la poitrine et au dos; dessous blanc à la bordure bien délimitée.	<b>ID:</b> 7.5" (19cm). Court bec noir; longues pattes jaunes; plumage chamois; dos moucheté de brun; tête semblable à celle d'une tourterelle.	<b>ID:</b> 8" (20cm). Petit limicole souvent trouvé sur les plages sablonneuses; barre allaire blanche; bord d'attaque de l'aile noir en vol; tête, dos et cou roux; dessous blanc au printemps; dos gris et dessous blanc à l'automne.	<b>ID:</b> 8.5" (22cm). Dos roux vif; ventre noir; longues pattes noires; bec sombre moyennement long et arqué.
<b>Bécassine de Wilson</b>	<b>Phalarope de Wilson</b>	<b>Phalarope à bec étroit</b>	<b>Bécasseau de Baird</b>	<b>Bécasseau à croupion blanc</b>	<b>Bécasseau semipalmé</b>	<b>Bécasseau minuscule</b>	 <p><b>Pour nous joindre:</b></p> <p><b>Téléphone/Fax:</b> 204-943-9029</p> <p><b>Email:</b> iba@naturemanitoba.ca</p> <p><b>Site web:</b> importantbirdareasmb.ca</p> <p><b>Partenaires</b></p>    <p>Toute photos d'oiseaux droit d'auteur de Christian Artuso</p>

<u>Bécasseaux (peeps)</u>	Brun doré	Gris
<b>Petit, ailes longues</b> Ailes repliées > longueur de la queue	<b>Bécasseau de Baird</b>	<b>Bécasseau à croupion blanc</b>
<b>Minuscule, ailes courtes</b> Ailes repliées = longueur de la queue	<b>Bécasseau minuscule (pattes jaunes)</b>	<b>Bécasseau semipalmé</b>

Créé avec des fonds du Fonds canadien pour la nature. This project was undertaken with the financial support of Environment and Climate Change Canada.