


























Oiseaux des terres humides communs des ZICO du Manitoba

Canard d'Amérique	Canard colvert	Sarcelle à ailes bleues	Canard souchet	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Fuligule à dos blanc	Fuligule à tête rouge
 <p>ID: 20" (51cm). Brun avec le derrière sombre; plaque blanche à l'avant de l'aile; front blanc avec une tache verte derrière l'œil; bec léger au bout noir chez les deux sexes; barboteur.</p>	 <p>ID: 23" (58cm). Tête verte; bec jaune; poitrine marron; collier blanc; corps pâle; pattes orange; barboteur.</p>	 <p>ID: 15" (38cm). Brune mouchetée de sombre; tache blanche au flanc et croissant blanc entre le bec foncé et les yeux; mâle à la tête bleutée; plaque bleue sur l'aile chez les deux sexes; barboteur.</p>	 <p>ID: 19" (48cm). Tête verte; poitrine blanche; ventre et flancs roux; dos noir et bec en cuillère allongé chez les deux sexes; barboteur.</p>	 <p>ID: 21" (53cm). Longue queue pointue, long cou; poitrine blanche et pointe blanche montant sur le cou; tête brun foncé; pattes grises; bec sombre; barboteur.</p>	 <p>ID: 14" (36cm). Notre plus petit canard, petit corps trapu; petit bec mince; plaque verte à l'aile; le mâle a une tête roux sombre; tache verte autour de l'œil; barboteur.</p> <p>Deux autres espèces de canards barboteurs sont trouvés régulièrement au Manitoba.</p>	 <p>ID: 20" (51cm). Tête rouge; yeux rouges; long bec effilé et fuyant; poitrine et derrière sombres; ailes et dos blancs; front fuyant; plongeur.</p>	 <p>ID: 18" (46cm). Tête rouge et ronde; yeux jaunes; ailes et corps gris; poitrine et derrière noirs; bec gris à bout noir; plongeur.</p>
 <p>Petit fuligule</p>	 <p>Harle couronné</p>	 <p>Érismature rousse</p>	 <p>Grèbe à bec bigarré</p>	 <p>Grèbe à cou noir</p>	 <p>Grèbe élégant</p>	 <p>Cormoran à aigrettes</p>	 <p>Butor d'Amérique</p>
 <p>ID: 17" (43cm). Tête, poitrine et derrière noirs; flancs blancs; dos rayé; bec gris-bleu; yeux jaunes; légère pointe à l'arrière du sommet du crâne; plongeur.</p>	 <p>ID: 18" (46cm). Petit canard au corps allongé; bec mince; il lève souvent la queue en nageant; huppe bouffante, brune chez la femelle, noir et blanc chez le mâle; la huppe peut être levée ou baissée; plongeur.</p>	 <p>ID: 15" (38cm). Large bec bleu; corps roux; tête noire; joue blanche; queue dressée; plongeur.</p> <p>Six autres espèces de canards plongeurs sont trouvés régulièrement au Manitoba.</p>	 <p>ID: 13" (33cm). Corps compact brun-noir; tête large; bec gris clair épais à anneau noir; queue à peine visible; œil noir avec anneau oculaire blanc.</p>	 <p>ID: 13" (33cm). Noir avec les flancs marron; éventail d'aigrettes dorées à l'oreille; bec mince, droit et sombre; yeux rouges.</p> <p>Il y a trois autres espèces de grèbes au Manitoba.</p>	 <p>ID: 16" (41cm). Long cou noir et blanc; poitrine et joues blanches; bec jaune très fin; yeux rouges; calotte et dos noirs.</p> <p>Il y a trois autres espèces de grèbes au Manitoba.</p>	 <p>ID: 33" (84cm). Adulte noir aux ailes cendrées; peau orange de la base du bec gris à l'œil; yeux verts; pattes noires; cou assez long, replié au vol. Le jeune est semblable avec la poitrine gris-chamois et le bec orange. Grandes étendues d'eau.</p>	 <p>ID: 28" (71cm). Héron rayé de brun et de chamois; cou épais se terminant en un long bec pointu; pattes et yeux jaunes. Le chant est une série de bruits de pompe, <i>oung ka' chounk</i>; il fait aussi des claquements et des sons nasillards.</p>

Oiseaux des terres humides communs des ZICO du Manitoba

Grand héron	Grande aigrette	Bihoreau gris	Marouette de Caroline	Foulque d'Amérique	Mouette de Franklin	Guifette noire	Sterne de Forster
 <p>© Christian Artuso</p> <p>ID: 45" (114cm). Plumage gris-bleu; tête, poitrines et ailes ébouriffées; bande noire sur les yeux; larges ailes bicolores; en vol, cou replié et pattes tenues bien droites vers l'arrière.</p>	 <p>ID: 39" (99cm). Plumage blanc; long cou replié en «S»; longues pattes noires; bec jaune; longues plumes blanches sur le dos en plumage nuptial; vol lent avec le cou replié et les pattes tenues bien droites vers l'arrière.</p>	 <p>ID: 24" (61cm). Trapu; plumage gris pâle; calotte et dos noirs; courtes pattes jaunes; bec noir et pointu; tête aplatie; yeux rouges. Les jeunes sont bruns.</p>	 <p>ID: 9" (23cm). Oiseau de marais dodu; bec jaune court; face noire; pattes jaunes; dos moucheté de brun et de noir; dessous gris; petite queue relevée. Souvent identifié au chant – un hennissement descendant et un keûr-oui ascendant.</p>	 <p>ID: 16" (41cm). Corps noir ressemblant à une poule; bec blanc incliné; yeux rouges; pattes jaune-vert; orteils lobés; elle plonge et barbotte lorsqu'elle se nourrit.</p>	 <p>ID: 14" (36cm). Tête noire; pattes et bec noirs en plumage nuptial; dos et ailes gris foncé aux bouts blancs; queue et dessous blancs. La mouette des terres humides la plus commune au Manitoba.</p>	 <p>ID: 9.5" (23cm). Petite sterne noire; ailes, dos et queue gris-argenté; poitrine, tête et bec noirs; sous-caudales blanches.</p>	 <p>ID: 13" (33cm). Blanche avec la calotte noire et les ailes grisâtres; bec orange à bout noir; longue queue fourchue; pattes orange. Elle se reproduit dans les marais. Semblable à la sterne pierregarin.</p>
 <p>ID: 5" (13cm). Oiseau minuscule sombre; ailes et queue brun-roux; corps robuste; queue dressée; sourcil blanc. Le chant est une série de notes gloussées suivie par un trille rapide.</p> <p>L'une des quatre espèces de troglodytes présentes régulièrement au Manitoba .</p>	 <p>ID: 5" (13cm). Corps brun sombre; gorge jaune; le mâle a un masque noir avec un sourcil blanc. Le chant est un ouistiti-ouistiti-ouistiti sifflé.</p>	 <p>ID: 5" (13cm). Jaune vif; poitrine rayée de roux chez le mâle. Elle niche dans les habitats broussailleux humides. Le chant est un tire tire tire la bibitte aigu.</p>	 <p>ID: 6.25" (16cm). Bruant trapu commun; queue relativement longue; raies fortes de la poitrine se concentrant en une tache sombre au centre; patron facial roux et gris; ligne de l'œil forte. Le chant est une suite de toui toui toui suivie d'une série de notes musicales fortes, rythmées et se terminant par une finale étirée.</p>	 <p>ID: 5.75" (13cm). Petit bruant sombre; calotte et tache allaire rousses; cercle oculaire, nuque, poitrine et dessous gris; petite gorge blanche; niche dans les marais.</p>	 <p>ID: 8.75" (20cm). Mâle noir caractéristique; épaulettes rouges, le liséré jaune est souvent visible. La femelle est rayée de brun. Le chant est une série de notes coulantes suivies d'un trille glougloutant, konk-la-rî.</p>	 <p>ID: 9.5" (23cm). Mâle au corps noir; tête et gorge jaunes; bec noir; tache noire autour de l'œil. La femelle est brune avec la gorge jaune. Le chant ressemble à un honki-tonk nasal.</p>	 <p>Pour nous joindre:</p> <p>Téléphone/Fax: 204-943-9029</p> <p>Email: iba@naturemanitoba.ca</p> <p>Site web: importantbirdareasmb.ca</p> <p>Partenaires</p> <p>  </p>

Toute photos d'oiseaux droit d'auteur de Christian Artuso

Créé à des fins d'éducation et de sensibilisation.
This project was undertaken with the financial support of
Environment and Climate Change Canada